


ගෙවත්ත සඳහා ආදර්ශ සැලසුමක් (වර්ග මීටර 1000 සඳහා)







ගෘහ ආර්ථිකය සහ පෝෂණය වැඩි දියුණුකර පවුල් ඒකක කවිඳිල ගැන්වීමේ ජාතික ගෙවතු වගා වැඩසටහන

විසිලි කලාපය
ආදර්ශ ගෙවතු සංවර්ධනය සඳහා උපදෙස්









කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රභාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්යය

පළතුරු කෘෂිකර්ම - ගෙවතු වගාව සඳහා උපදෙස්

වගාවේ නම	සංරච්ඡා	බිජු විකේතන	මැ	වැටීමේ කාලය
වගාවේ නම				
වගාවේ නම	<p>වීර පිටුරීමට සති 2-3 හට පෙර සෙ.මී. 30 පමණ ගැඹුරට බිම සොරු සැට පොඩි සාදන්න. පළතුරු බස ගත වැටී උත් පැරවී තබා ගන්න.</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>
සාධාරණ පොහොර	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>
පරිසරය	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>
බීජ/පළතුරු පිටුරීම	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>
වගාවේ නම	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>
අත්වැන්න	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>
පෝෂණ දුහත	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>	<p>වගාවේ නම</p>





වගාවේ නම සඳහා අවශ්‍ය වීර ගෙවතු ගොඩනැගීමේ ඡිප්පටා ගන්න.

වියළි කලාපයේ - ගෙවතු වගාව සඳහා උපදෙස්

	නවීන් 	තම්පලා 	පිපිඤ්ඤා 
බෝගය සහ බීජ වල ස්වරූපය			
බිම් සැකසීම	පැළ හෝ බීජ සිටුවීමට සති 2-3 කට පෙර කෙ.මී. 30 පමණ ගැඹුරට බිම පෙරලා කැට පොඬි කරන්න. ජලය බැස යන පරිදි උස් පාත්ති සකසා ගන්න.	බීජ සිටුවීමට සති 2-3 කට පෙර කෙ.මී 30 පමණ ගැඹුරට බිම පෙරලා කැට පොඬි කරන්න. ජලය බැස යන පරිදි උස් පාත්ති සකසා ගන්න.	වල් පැළැටි ඉවත්කර පස නොදීත් මුරුල්කට සියුම්ව සකසා ගන්න. බෝගය අනුව සුදුසු පරතරයට දිග, පළල සහ ගැඹුර කෙ.මී. 30 ක් පමණ වූ වලවල් සකසා ගන්න.
කාබහිත පොහොර	බෝගයට අදාළ පරතරයට සකසා ගත් වලවල්වලට හොඳින් දිරා කොම්පෝස්ට්, ගොම, කුකුළු පොහොර වැනි සත්ත්ව පොහොර, කොළ පොහොර, කට දැහැයා වැනි කාබහිත පොහොර අවම වශයෙන් ලෝන් 4-5 ක් වත් එක්කර පස සමන මිශ්‍ර කරන්න. පාත්තිවල වගා කරන්නේ නම් වර්ග මීටරයකට හොඳින් දිරා කාබහිත පොහොර අවම වශයෙන් කුඩයක් (කි.ග්‍රෑම් 2ක්) පමණ එක්කර පස සමන හොඳින් කලවම් කරන්න. බීජ හෝ පැළ සිටුවීමට සති 2කට පමණ පෙර කාබහිත පොහොර යෙදීම වඩා සුදුසුයි.		
පරතරය	පේළි අතර කෙ.මී. 45 පේළිය තුළ, පැළ අතර කෙ.මී. 45	පේළි අතර කෙ.මී 30 පේළිය දිගේ තුනිටට බීජ දමන්න.	පේළි අතර, මීටර 1 පේළිය තුළ, පැළ අතර මීටර 1
බීජ/පැළ සිටුවීම	එක වලක බීජ 2 ක් සිටුවන්න.	බීජ කෙ.මී 1 ක් පමණ ගැඹුරට දමන්න. බීජ වැලි සමන මිශ්‍රකර යෙදීමෙන් තුනිටට බීජ දැමීම පහසු වේ.	එක් වලක එකිනෙකට තරමක් දුරින් බීජ 3-4 බැගින් (කෙ.මී. 2-3 ගැඹුරින්) සිටුවන්න. බීජ පැළැටි සති 2 ක් ගතවූ පසු එක් වලක පැළ 2 ක් ඉතිරි කර වැඩි පැළ ඉවත් කරන්න.
වගා කාලය සටහන	දියකරගත් අමු ගොම පත්‍ර තෙමෙන සේ සති කිහිපයකට වරක් යොදන්න. පොළොව වටාමේ සිට අඟල් 6-8 ක් වර්ධනය වූ පසු අග්‍රස්ථය කපා දැමීමෙන් පසුවත් ආකාරයට වර්ධනය කර ගැනීම හෝ සිටුවා සති 3-4 කදි පොළොව වටාමේ සිට අඩි 1-1 1/2 උසින් සිටින සේ පාත්තියට ඉහළින් සැකසූ මැස්සකට යැවීම ද කළ හැකිය.	පැළ ගහනය වැඩි වීම නිසා දුර්වල පැළ ඇතිවේ. එවැනි අවස්ථාවක පැළ තුනි කරන්න.	පැළවලට මීටර 1 1/2 පමණ උස ආධාරක කෝටු සිටුවා ඒවා අතර වැටක් ආකාරයට ලක්‍රු ඇඳ වැල් ඒවාට යොමුකරන්න. යටිකුරු "වී" (A) ආකාරයට සකසා ගත් පත්දලමකට ද, යැවිය හැකිය.
අස්වැන්න	අස්වැන්න වටින් වට නෙළාගත හැකිය. දණ්ඩ සමන කරවී කැපීම මගින් වර්ධක වර්ධනය දිගටම පවත්වා ගත හැකිය. මල් පිපීමට ඉඩකැටීමෙන් වර්ධනය බාලවේ. මල් කිහිපි කඩා ඉවත් කරන්න.	සති 4-6 කදී පමණ ගස් සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවා ගැනීම හෝ කඳ කපා ගැනීම තුළින් වටින් වට අස්වනු ගැනීම සඳහා වගාව පවත්වා ගත හැකිය.	පළමු අස්වැන්න මාස 2 කදී පමණ ලබාගත හැක.
පෝෂණ ගුණය	විටමින් ඒ, යකඩ හා දළ තන්තු බහුල වළවළුවකි.	යකඩ, කැල්සියම් සහ තන්තු බහුල පමා වර්ගයකි.	දළ තන්තු බහුල පහසුවෙන් ජීරණය වන වළවළුවකි.

නිරෝගී දිවියක් සඳහා දිනකට වළවළු සහ පලතුරු වර්ග 05 ක් ආහාරයට ගන්න.
 කාන්තාර කොරතුරු සඳහා 1920 (කෘෂි උපදේශන සේවාව) දුරකථන අංකය අමතන්න. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය, 2020

වියළි කලාපයේ - ගෙවතු වගාව සඳහා උපදෙස්

	මිරිස් 	මාළුමිරිස් 	තක්කාලි 	ඔටු 
බීජ සැකසීම	<p>මිරිස්, මාළුමිරිස්, තක්කාලි, ඔටු වැනි බෝග පසුගිය කන්නයේ වගා නොකළ ස්ථානයක් මේ සඳහා වඩාත් සුදුසුය. පැළ හෝ බීජ සිටුවීමට සති 2-3 කට පෙර සෙ.මි. 30 පමණ ගැඹුරට බීම පෙරළා කැට පොඬි කරන්න. ජලය ඔසා යන පරිදි උස් පාර්ති සකසා ගන්න. කොම්පෝස්ට් හා මතුපිට පස් 1:1 අනුපාතයට දුරවනලද සිලෝ ග්‍රෑම් 10 ප්‍රමාණයේ නාල්මළ හෝ පොලිතින්මළ වලද සිටුවිය හැකිය.</p>			
කාබනික පොහොර	<p>බෝගයට අදාළ පරතරයට සකසා ගත් වලවල්වලට හොඳින් දිරා කොම්පෝස්ට්, ගොම, කුකුළු පොහොර වැනි සත්ත්ව පොහොර, කොළ පොහොර, කට දහයියා වැනි කාබනික පොහොර අවම වශයෙන් දොල් 4-5 ක් වත් එක්කර පස සමඟ මිශ්‍ර කරන්න. පාර්තිවල වගා කරන්නේ නම් වර්ග මීටරයකට හොඳින් දිරා කාබනික පොහොර අවම වශයෙන් කුඩයක් (කි.ග්‍රෑම් 2ක්) පමණ එක්කර පස සමඟ හොඳින් කලවම් කරන්න. බීජ හෝ පැළ සිටුවීමට සති 2කට පමණ පෙර කාබනික පොහොර යෙදීම වඩා සුදුසුයි.</p>			
පරතරය	ජේලි අතර සෙ.මි 60 ජේලිය තුළ, පැළ අතර සෙ.මි 45	ජේලි අතර සෙ.මි. 40 ජේලිය තුළ, පැළ අතර සෙ.මි. 40	ජේලි අතර සෙ.මි. 45 ජේලිය තුළ, පැළ අතර සෙ.මි. 45	ජේලි අතර සෙ.මි. 90 ජේලිය තුළ, පැළ අතර සෙ.මි. 60
බීජ/පැළ සිටුවීම	දින 25-30 ක් වයසැති පැළ 2 ක් එක් වලක පරතරයක් සිටින සේ, මුල් හොඳින් පසට යටවන පරිදි සිටුවා ජලය යොදා සෙවන සපයන්න.		දින 14-21 ක් වයසැති පැළ 2 ක් එක් වලක පරතරයක් සිටින සේ, මුල් හොඳින් පසට යටවන පරිදි සිටුවා ජලය සපයා සෙවන කරන්න.	
වගා පාලන කටයුතු	කොළකොඩිවල වැනි හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා හිතර පටික්ෂා කර හානිය මුල් අවස්ථාවේම හඳුනාගන්න. දින 3-4 කට එරෙහිව ජලය ස්ප්‍රේ කිරීම හෝ පිඩනයක් යටතේ පත්‍ර වලට ඉසින්න. වරින් වර කොහොඹ බීජ නිස්සාරකය හෝ කොහොඹ පත්‍ර, කුරුඳු, සුදුසුනු, ඉකුරු වැනි පලිබෝධනාශක ගුණ ඇති ගසා කාර ඉසින්න. පිදුරු, ග්ලිබ්සිඩයා කොළ වැනි දෑ වලින් වසුනක් යොදන්න. පසේ තෙතමනය හොඳින් පවත්වා ගන්න.		ගස් කඩා වැටීම වැළැක්වීමට හා ගෙඩි පොළොවේ ගැඹුණු කුණුවීම වළක්වා ගැනීමට සිටුවා සති 3-4 කදී ආධාරක කෝටු සිටුවන්න. ගසේ වර්ධනය අනුව පුරුක් 3-4 කට එරෙහිව ගස ආධාරකයට ලිඟිල්ල ගැට ගසන්න. පසේ තෙතමනය හොඳින් පවත්වා ගන්න.	
අස්වැන්න	පළමු අස්වැන්න මාස 2-2 1/2 කදී ලබාදේ.		පළමු අස්වැන්න මාස 2-2 1/2 කදී ලබාදේ.	
පෝෂණ ගුණය	කැල්සියම්, විටමින් ඒ හා සී බහුලයි.		ඉඳහු තක්කාලිවල කැල්සියම්, පොස්පරස් සහ විටමින් සී බහුලය පිළිකා නාශක ගුණයෙන් යුතු ලයිකොපින් සංයෝගය බහුලව අඩංගු වේ.	

වලවම් සහ පලතුරු වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීමෙන් පිළිකා ඇතුළු බොහෝ රෝග වැළැක්වීමේ අවදානම අඩුවේ.
 තාක්ෂණික තොරතුරු සඳහා 1920 (කෘෂි උපදේශන සේවාව) දුරකථන අංකය අමතන්න. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය, 2020