வீட்டுத் தோட்டத்திற்கான மாதிரி திட்டமிடல் (1000 சதுர மீற்றர்)



வீட்டுப் பொருளாதாரம் மற்றும் போசணையை மேம்படுத்தி
குடும்ப அலகுகளை வலுவூட்டும்

தேசிய வீட்டுத் தோட்டச் செயற்திட்டம்

உலர் வலயம்

மாதிரி வீட்டுத் தோட்ட அபிவிருத்திக்கான ஆலோசனைகள்

"விவசாயத் திணைக்களம், விவசாய அமைச்சு"

பொருளாதார மறுமலர்ச்சி, வறுமை ஒழிப்புக்கான செயற்குழு

உலர் வலயத்தில் வீட்டுத் தோட்டச் செய்கைக்கான ஆலோசனைகள்

	பாகல்	வெண்டி	பயிற்றை	பீர்க்கு
[illegible]	 1	 2	 3	 4
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

அடுத்த பயிர்ச்செய்கைக்கு தேவையான விதைகளை உங்கள் வீட்டுத் தோட்டத்திலேயே உற்பத்தி செய்து கொள்ளுங்கள்.

[illegible]

உலர் வலயத்தில் வீட்டுத் தோட்டச் செய்கைக்கான ஆலோசனைகள்

[illegible]	பசளி 5	[illegible] 6	வெள்ளரி 7
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

உலர் வலயத்தில் வீட்டுத் தோட்டச் செய்கைக்கான ஆலோசனைகள்

பயிர், விதைகள் தோற்றம்	மிளகாய்	கறிமிளகாய்	தக்காளி	கத்தரி
	 8	 9	 10	 11
நிலப் பண்படுத்தல்	மிளகாய், கறிமிளகாய், தக்காளி, கத்தரி போன்ற பயிர்களை முன்னைய போகத்தில் பயிரிடாத இடமொன்றில் நடுகைக்கு உகந்தது. நாற்றை நடுவதற்கு 2-3 கிழமைகளுக்கு முன்னர் 30 ச.மீ ஆழத்துக்கு மண்ணைப் புரட்டி கட்டிகளை உடைத்துக் கொள்ளவும். நீர் வடிந்தோடக் கூடிய விதத்தில் உயர் பாத்திகளை அமைத்துக் கொள்ளவும். கூட்டெரு, மேல் மண் ஆகியவற்றை 1:1 என்ற விகிதத்தில் நிரப்பி 16 கிலோ கிராம் பெற்று அரிசிப்பை அல்லது பொலித்தீன் பைகளில் நடலாம்.			
சேதனப் பசளை	பயிரிடும் உரிய நடுகை இடைவெளிகளில் அமைத்துக் கொண்ட நடுகைக் குழிகளுக்கு நன்கு மக்கிய கூட்டெரு, சாணம், கோழியெரு போன்ற விலங்கு பசளைகள், மற்றும் பசுந்தாட் பசளை போன்ற சேதனப் பசளை வகைகளில் குறைந்தது 4 - 5 கைப்பிடியளவு சேர்த்து மண்ணுடன் கலந்து விடவும். பாத்தியின் 1 சதுர மீற்றர் பரப்பிற்கு குறைந்தது ஒரு கூடை (2 கிலோ) விலங்கு சேதனப் பசளை இட்டு மண்ணுடன் நன்கு கலந்து விடவும். விதைகளை அல்லது நாற்றுக்களை நடுவதற்கு 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக சேதனப் பசளைகளை இடுவது சிறந்தது.			
நடுகை இடைவெளி	வரிசைகளுக்கிடையில் 60 செ.மீ வரிசையில் நாற்றுக்களுக்கு இடையில் 45 செ.மீ	வரிசைகளுக்கிடையில் 60 செ.மீ வரிசையில் நாற்றுக்களுக்கு இடையில் 45 செ.மீ	வரிசைகளுக்கிடையில் 60 செ.மீ வரிசையில் நாற்றுக்களுக்கு இடையில் 45 செ.மீ	வரிசைகளுக்கிடையில் 90 செ.மீ வரிசையில் நாற்றுக்களுக்கு இடையில் 60 செ.மீ
விதை நாற்று நடல்	ஒவ்வொரு நடுகைக் குழிக்குள்ளும் 25 - 30 நாட்கள் வயதுடைய நாற்றுக்கள் இரண்டினை இடைவெளி விட்டு, நாற்றுக்களின் வேர் மண்ணினுள் நன்கு புதையும் வண்ணம் நட்டு நீர் வழங்கி நிழல் கொடுக்கவும்.		ஒவ்வொரு நடுகைக் குழிக்குள்ளும் 14 - 21 நாட்கள் வயதுடைய நாற்றுக்கள் இரண்டினை இடைவெளி விட்டு, நாற்றுக்களை வேர் மண்ணினுள் நன்கு புதையும் வண்ணம் நட்டு நீர் வழங்கி நிழல் கொடுக்கவும்.	ஒவ்வொரு நடுகைக் குழிக்குள்ளும் 25 - 30 நாட்கள் வயதுடைய நாற்றுக்கள் இரண்டினை இடைவெளி விட்டு, நாற்றுக்களின் வேர் மண்ணினுள் நன்கு புதையும் வண்ணம் நட்டு நீர் வழங்கி நிழல் கொடுக்கவும்.
பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகள்	இலைச் சுருளலைக் கட்டுப்படுத்த அடிக்கடி பரிசோதித்து பாதிப்பு ஆரம்ப நிலைமையில் அகற்றிக் கொள்ளவும். 3 - 4 நாள் இடைவெளியில் நீரை விசிறவும். அல்லது அழுக்கத்துடன் நீரை இலைக்கு விசிறவும். வேப்ப விதை, வேப்ப இலைச் சாறு, கறள், பூடு, இஞ்சி போன்ற நச்சுத் தன்மையுடைய தாவரச் சாறுகளை விசிறவும். அவசியமேல் கிளிசிடியாக் குழைகளால் மூடுபடையிடவும். மண்ணின் ஈரலிப்பைப் பேணவும்.		நாற்று உடைவதைத் தவிர்க்கவும். காய்கள் நிலத்துடன் சேர்ந்து அழுகுவதைத் தடுக்கவும் நட்டு 2-3 கிழமைகளில் ஆதாரத்தை வழங்கவும். பயிரின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப 3-4 கணு இடைவெளியில் ஆதாரத்துடன் தளர்வாக கட்டி விடவும். மண்ணின் ஈரலிப்பைப் பேணவும்.	பிரதான தண்டின் கீழேயுள்ள கிளைகளை வெட்டவும். நுனி வாடியிருப்பின் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துடன் சேர்த்து நுனி அகற்றவும். பாதிக்கப்பட்ட அரும்பு, காய்களை அகற்றி புதைக்கவும் அல்லது எரிக்கவும். மண்ணின் ஈரலிப்பைப் பேணவும்.
விளைச்சல்	2 - 2½ மாதங்களில் முதல் அறுவடையைப் பெறலாம்.	2 - 2½ மாதங்களில் முதல் அறுவடையைப் பெறலாம்.	2 - 2½ மாதங்களில் முதல் அறுவடையைப் பெறலாம்.	2 - 2½ மாதங்களில் முதல் அறுவடையைப் பெறலாம்.
போசணைப் பெறுமானம்	கல்சியம், உயிர்ச்சத்து "சி" உயிர்ச்சத்து "ஏ" அதிகம் காணப்படும்.	கல்சியம், உயிர்ச்சத்து "சி" உயிர்ச்சத்து "ஏ" அதிகம் காணப்படும்.	பழுத்த காயில் கல்சியம் பொசுபரசு மற்றும் உயிர்ச்சத்து "சி" அதிகம் காணப்படும். புற்று நோய் எதிர்ப்புத்தன்மை கொண்ட லைகோபீன் காணப்படும்.	உயிர்ச்சத்து "பி" மற்றும் நார்ப் பொருள்கள் அதிகம் காணப்படும்.

மரக்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகளவில் உண்பதால் புற்றுநோய் உட்பட அநேகமான நோய்கள் தொற்றும் அபாயம் குறைவடையும்

தொழில்நுட்ப தகவல்களுக்கு 1920 (விவசாய ஆலோசனை சேவை) தொலைபேசி இலக்கத்தை அழைக்கவும். விவசாயத் திணைக்களம், பேராதனை - 2020